

・救急入院となった発熱を伴う急性錯乱様状態患者。 ・緊急CTは、疑い程度で明確な陽性所見なし。		A 統合失調症 B 脳炎 C _____ D _____ E _____	
		A	B
対処① 抗精神病薬投与	利益 ↑ ↓ 不利益		
対処② アシクロビル点滴	利益 ↑ ↓ 不利益		
対処③	利益 ↑ ↓ 不利益		
対処④	利益 ↑ ↓ 不利益		

診断確率 A(0.70) B(0.30) C(0.00) D(0.00) E(0.00)
 対処① (5) * A + (1) * B + (0) * C + (0) * D + (0) * E = 利益 (3.80)
 (2) * A + (20) * B + (0) * C + (0) * D + (0) * E = 不利益 (7.40) 【差 = -3.60】
 対処② (0) * A + (15) * B + (0) * C + (0) * D + (0) * E = 利益 (4.50)
 (4) * A + (2) * B + (0) * C + (0) * D + (0) * E = 不利益 (3.40) 【差 = 1.10】
 対処③ (0) * A + (0) * B + (0) * C + (0) * D + (0) * E = 利益 (0.00)
 (0) * A + (0) * B + (0) * C + (0) * D + (0) * E = 不利益 (0.00) 【差 = 0.00】
 対処④ (0) * A + (0) * B + (0) * C + (0) * D + (0) * E = 利益 (0.00)
 (0) * A + (0) * B + (0) * C + (0) * D + (0) * E = 不利益 (0.00) 【差 = 0.00】

年月日 : 2015/08/03

<p>・救急入院となった発熱を伴う急性錯乱様状態患者。 ・緊急CTは、疑い程度で明確な陽性所見なし。</p>	<p>A 統合失調症 _____</p> <p>B 脳炎 _____</p> <p>C _____</p> <p>D _____</p> <p>E _____</p>				
	A	B	C	D	E
<p>対処①</p> <p>抗精神病薬投与</p>	<p>症状改善が見込める／多少の副作用がある</p>	<p>多少の鎮静が得られる／治療が手遅れになる</p>			
<p>対処②</p> <p>アシクロビル点滴</p>	<p>効果はまったくくない／治療遅延、経済的コスト</p>	<p>ヘルペス脳炎だった場合、脳の非可逆的侵襲の回避の可能性／経済的コスト</p>			
<p>対処③</p>					
<p>対処④</p>					